

# こんな症状があったら この病院へ! ②

病名	症状	名医のいる病院	所在地・電話番号
内臓疾患	<b>糖尿病</b> 尿が泡立ち、黄色の泡になる。体重が激減する。爪に横線や横溝が出る。異様にのどが渇き、夜中に何度も水を飲む。目の中で雲が湧いたように見える。こうした症状が徐々に現れる。悪化すると、失明や手足の切断などを余儀なくされるので要注意。	東京女子医科大学 糖尿病センター	東京都新宿区河田町8-1 ☎03-3353-8111
		東京都済生会向島病院 糖尿病センター	東京都墨田区八広1-5-10 ☎03-3610-3651
		住友病院 内科	大阪府大阪市北区中之島5-3-20 ☎06-6443-1261
肝硬変	全身に倦怠感が襲い、微熱も続く。皮膚が黒褐色になり、指先や指の付け根が赤くなる。腹や胸に血管が浮き出て、指先も小さなボールのように膨らむ。また、手足の爪が白濁することもある。進行すると、腹水がたまり、吐血したり黒い便が出たりする。	新潟大学医学部附属病院 第3内科	新潟県新潟市旭町通一番町754 ☎025-223-6161
		虎の門病院 消化器科	東京都港区虎ノ門2-2-2 ☎03-3588-1111
		北里大学東病院 消化器内科	神奈川県横浜市中区清治2-1-1 ☎042-748-9111
痛風	足の親指の付け根が突然赤く腫れ上がる。2~3日間は歩けないほどの激痛だが、1週間ほど経つと痛みは消える。しかし、半年から1年後に再び発作が起こり、次第にその期間が短くなる。完治には根気強い治療が必要。膝などの関節が痛む場合もある。	東京女子医科大学附属 膠原病リウマチ病センター	東京都新宿区河田町10-22 ☎03-5269-1711
		東京都立墨東病院 リウマチ科	東京都墨田区江東橋4-23-15 ☎03-3633-6151
		慶知医科大学附属病院 痛風・リウマチ科	愛知県豊田市長久寺町宮作番又21 ☎0561-62-3311

病名	症状	名医のいる病院	所在地・電話番号
脳疾患	<b>脳出血</b> 脳出血やクモ膜下出血の場合も、早期の兆候はある。発作の1~3週間前に、頭痛、めまい、光がまぶしいという異常を感じる。この時点で病院へ行くべきである。出血すると、後頭部からうなじにかけて、経験したことのないような激痛に突然襲われる。嘔吐や首の後ろの硬直が起こり、数十分以内に意識を失う。クモ膜下出血は40代の中年に、脳出血は高齢者に多いとされていたが、最近では20代~30代の若年層でも発病している。発病後、脳出血は顔や手足の麻痺、失語症などの後遺症が残るが、クモ膜下出血の場合はこれらの神経症状が出ることは少ない。	獨協医科大学病院 脳神経外科	栃木県下野郡壬生町大字北小井800 ☎0282-86-1111
		黒沢病院 脳神経外科	群馬県高崎市中原町3-19-2 ☎027-352-1166
		帝京大学医学部附属病院 脳神経外科	東京都板橋区加賀2-11-1 ☎03-3964-1211
クモ膜下出血	激しいめまいを感じるが聴力には異常がないという場合は、脳梗塞または脳腫瘍の前兆の疑いが濃い。脳腫瘍の場合は、次第に頭がはちきれんような痛みを感じ、目を追うごとに痛みは強くなる。腫瘍が発生した箇所によっては、吐き気、突然の嘔吐、手足のしびれなども伴う。腫瘍が破れると突然、激しい頭痛に襲われる。脳梗塞の場合は、必ずしも頭痛を伴うとは限らない。早期の自覚症状としては、脳の血管が小さな血栓で詰まるために、手足のしびれ、ろれつが回らない、片側の目の視力障害、一過性の半身麻痺などが一時的に起こることが挙げられる。	慶應義塾大学病院 脳神経外科	東京都新宿区信濃町35 ☎03-3353-1211
		藤田保健衛生大学病院 脳神経外科	愛知県豊田市香取町岡本+番1-98 ☎0562-93-9253
		大阪大学医学部附属病院 脳神経外科	大阪府吹田市山田丘2-15 ☎06-6879-5111
脳梗塞	激しいめまいを感じるが聴力には異常がないという場合は、脳梗塞または脳腫瘍の前兆の疑いが濃い。脳腫瘍の場合は、次第に頭がはちきれんような痛みを感じ、目を追うごとに痛みは強くなる。腫瘍が発生した箇所によっては、吐き気、突然の嘔吐、手足のしびれなども伴う。腫瘍が破れると突然、激しい頭痛に襲われる。脳梗塞の場合は、必ずしも頭痛を伴うとは限らない。早期の自覚症状としては、脳の血管が小さな血栓で詰まるために、手足のしびれ、ろれつが回らない、片側の目の視力障害、一過性の半身麻痺などが一時的に起こることが挙げられる。	札幌医科大学医学部附属病院 脳神経外科	北海道札幌市中央区南1条西16 ☎011-611-2111
		日本医科大学附属病院 脳神経外科	東京都文京区千駄木1-1-5 ☎03-3822-2131
		杏林大学医学部附属病院 脳神経外科	東京都三鷹市新川6-20-2 ☎0422-47-5511
脳腫瘍	激しいめまいを感じるが聴力には異常がないという場合は、脳梗塞または脳腫瘍の前兆の疑いが濃い。脳腫瘍の場合は、次第に頭がはちきれんような痛みを感じ、目を追うごとに痛みは強くなる。腫瘍が発生した箇所によっては、吐き気、突然の嘔吐、手足のしびれなども伴う。腫瘍が破れると突然、激しい頭痛に襲われる。脳梗塞の場合は、必ずしも頭痛を伴うとは限らない。早期の自覚症状としては、脳の血管が小さな血栓で詰まるために、手足のしびれ、ろれつが回らない、片側の目の視力障害、一過性の半身麻痺などが一時的に起こることが挙げられる。	福井医科大学医学部附属病院 脳神経外科	福井県吉田郡松岡町下合月23-3 ☎0776-61-3111
		住友病院 神経内科	大阪府大阪市北区中之島5-3-20 ☎06-6443-1261
		厚南セントラル病院 脳神経外科	山口県宇部市厚南区東側108 ☎0836-44-2111

病名	症状	名医のいる病院	所在地・電話番号
心臓疾患	<b>狭心症</b> 狭心症の自覚症状は、以下の10項目だ。①胸の中央部からみぞおちにかけて、締めつけられるような胸痛が数十秒~30分間続く。②少し運動しただけで、動悸・息切れがしやすい。③寝苦しくて何度も目がさめる。④明け方、決まった時間に胸痛が起きる。⑤首筋、舌裏の静脈が腫れて太くなる。⑥上半身を高くすると眠りやすい。⑦全身、特に顔や足のすねがむくむ。⑧脈がいつも速い。⑨手足の指先が紫色になる。⑩SEX中に息苦しくなる。このうち一つでも該当する際には、狭心症を疑うべきだ。心筋梗塞の場合は、胸の中央部に激痛が30分~数時間ほど走る。この時に、顔面蒼白・嘔吐・冷や汗を伴い、失神することもある、といった症状となる。動脈瘤の場合は自覚症状がほとんどないため、身体検査でコレステロール値が高い、動脈硬化が認められる、という結果が出た際には、早急に精密検査を受けること。	国立療養所帯広病院 心臓血管外科	北海道帯広市西18条北2-16 ☎0155-33-3155
		神原記念クリニック	東京都新宿区西新宿4-1-INSビル4F ☎03-3344-3313
		順天堂大学医学部附属順天堂医院 胸部外科	東京都文京区本郷3-1-3 ☎03-3813-3111
心筋梗塞	狭心症の自覚症状は、以下の10項目だ。①胸の中央部からみぞおちにかけて、締めつけられるような胸痛が数十秒~30分間続く。②少し運動しただけで、動悸・息切れがしやすい。③寝苦しくて何度も目がさめる。④明け方、決まった時間に胸痛が起きる。⑤首筋、舌裏の静脈が腫れて太くなる。⑥上半身を高くすると眠りやすい。⑦全身、特に顔や足のすねがむくむ。⑧脈がいつも速い。⑨手足の指先が紫色になる。⑩SEX中に息苦しくなる。このうち一つでも該当する際には、狭心症を疑うべきだ。心筋梗塞の場合は、胸の中央部に激痛が30分~数時間ほど走る。この時に、顔面蒼白・嘔吐・冷や汗を伴い、失神することもある、といった症状となる。動脈瘤の場合は自覚症状がほとんどないため、身体検査でコレステロール値が高い、動脈硬化が認められる、という結果が出た際には、早急に精密検査を受けること。	新東京病院 心臓血管外科	千葉県松戸市根本473-1 ☎047-366-7000
		大和成和病院 心臓病センター	神奈川県大和市南林町9-8-2 ☎046-278-3911
		豊橋ハートセンター	愛知県豊田市山崎字五分取21-1 ☎0532-37-3377
動脈瘤	狭心症の自覚症状は、以下の10項目だ。①胸の中央部からみぞおちにかけて、締めつけられるような胸痛が数十秒~30分間続く。②少し運動しただけで、動悸・息切れがしやすい。③寝苦しくて何度も目がさめる。④明け方、決まった時間に胸痛が起きる。⑤首筋、舌裏の静脈が腫れて太くなる。⑥上半身を高くすると眠りやすい。⑦全身、特に顔や足のすねがむくむ。⑧脈がいつも速い。⑨手足の指先が紫色になる。⑩SEX中に息苦しくなる。このうち一つでも該当する際には、狭心症を疑うべきだ。心筋梗塞の場合は、胸の中央部に激痛が30分~数時間ほど走る。この時に、顔面蒼白・嘔吐・冷や汗を伴い、失神することもある、といった症状となる。動脈瘤の場合は自覚症状がほとんどないため、身体検査でコレステロール値が高い、動脈硬化が認められる、という結果が出た際には、早急に精密検査を受けること。	岸和田徳洲会病院 心臓血管外科	大阪府岸和田市磯上町4-22-38 ☎072-438-8781
		倉敷中央病院 循環器内科	岡山県倉敷市美和1-1-1 ☎086-422-0210
		小倉記念病院 心臓血管外科	福岡県北九州市小倉北区貴船町1-1 ☎093-921-2231